

マルバシモツケ

バラ科 シモツケ属 (落葉低木)

学名 : *Spiraea betulifolia* 英名 : (Spirea)



- ・葉 : 倒卵形~広卵形で先は円い、互生
ふちの下部は全縁
先は鈍鋸歯
- ・花 : 複散房花序に白色の花
- ・高山や山地の岩場に生育

ミヤマホツツジ (ハコツツジ)

ツツジ科 ホツツジ属 (落葉小低木)

学名 : *Tripetaleia bracteata*



- ・葉 : 狭倒卵形~へら状、ふちは全縁、互生、下部へ次第に狭くなる
- ・花 : 白色、3裂、反り返る

キバナシャクナゲ

ツツジ科 ツツジ属 (常緑小低木)

学名 : *Rhododendron aureum*



- ・葉 : 長だ円形~広だ円形、革質、表にシワ、枝先に多数集まって互生、先は円頭、全縁
- ・花 : 淡黄色の漏斗状鐘形、内側上部に斑点、5裂
- ・高山に生える常緑低木、茎は地をはう

コケモモ (フレップ)

ツツジ科 スノキ属 (常緑小低木)

学名 : *Vaccinium Vitis* 英名 : Cowberry



- ・葉：長だ円形、厚い革質
- 表は濃緑色で光沢
- 密に互生する
- ・花：鐘形、淡紅色、下向き

- ・果実：球形、紅色、食用 (ジャム・果実酒)
- ・茎の下部は地中をはう

シラタマノキ (シロモノ)

ツツジ科 シラタマノキ属 (常緑小低木)

学名 : *Gaultheria Miqueliana* 英名 : Canada tree



- ・葉：だ円形、ふちは鈍鋸歯、葉脈はくぼんで裏に突出
- 革質で光沢あり、互生
- ・花：壺状、白色で総状花序に下向きにつく
- ・果実：淡紅白色、果肉はサリチル酸 (サロメチール) の香り

アカモノ (イワハゼ)

ツツジ科 シラタマノキ属 (常緑小低木)

学名 : *Gaultheria adenostrix* 英名 : (Canada tree)



- ・葉：卵形、革質、ふちは細鋸歯、互生
- 裏は剛毛を散生し、葉脈が突出
- ・花：鐘形、白色で下向きに咲く
- 花柄には赤褐色の長毛を密生
- ・果実：赤色の球形

ツルアジサイ (ゴトウヅル)

ユキノシタ科 アジサイ属 (落葉つる性)

がくめい えいめい
学名 : *Hydrangea petiolaris* 英名 : (Hydrangea)



- ・葉 : 卵円形、ふちは細鋸齒、対生
- ・花 : 両性花多数と白いがく片の装飾花
- ・類似種の見分け方

- ・ツルアジサイ : 装飾花のがく片は3~4枚、樹皮は紙状に薄く剥がれやすい
- ・イワガラミ : 装飾花のがく片は1枚、樹皮はほとんど剥がれず、皮目が目立つ

ヤマブドウ

ブドウ科 ブドウ属 (落葉つる性)

がくめい えいめい
学名 : *Vitis Coignetiae* 英名 : (Grape-Vine)



- ・葉 : 互生、五角状円心形、3~5浅裂、先は尖る、ふちは鋸齒、基部は深い心形
- 表は初め有毛であとは無毛、裏は赤褐色のくも毛、洋紙質
- ・花 : 雌雄異株、淡黄緑色
- ・果実 : 球形、紫黒色に熟す、食用

サルナシ (コクワ、シラクチヅル)

マタタビ科 マタタビ属 (落葉つる性)

学名 : *Actinidia arguta* 英名 : (Kiwi fruit)



・葉 : **だ円形**~**広だ円形**

刺状の鋸齒、互生

基部は**円形**か**やや心形**

先は**短く鋭く**尖る、

硬紙質、光沢がある

・花 : **白色**、**花弁5枚**

・果実 : **広だ円形**、**緑色**に熟す

マタタビ

マタタビ科 マタタビ属 (落葉つる性)

学名 : *Actinidia polygama* 英名 : Silver vine



・葉 : **広卵形**~**だ円形**、互生

先は**尖り鋸齒縁**

基部は**円形**~**浅心形**

枝の**上部**では**一部白く**

なる


・花 : **白色** **5弁**まれに**4弁**

・果実 : **長だ円形**で**先は尖る**、**黄緑色**~**黄褐色**に熟す、**食用** (果実酒)、**果実**にできた**虫こぶ**は**薬用**になる

ミヤママタタビ

マタタビ科 マタタビ属 (落葉つる性)

学名 : *Actinidia Kolomikta* 英名 : Kolomikta-Vine



・葉 : **長だ円形**、**細鋸齒縁**

基部は**心形**、互生

枝の**上部**では**一部が白色**

紅色を帯びる

・花 : **白色** **5弁**

・果実 : **マタタビ**よりも**やや小さい**、**黄緑色**に熟す、**食用** (果実酒)

ツルマサキ

ニシキギ科 ^かニシシギ属 ^{ぞく}(常緑つる性) ^{じょうりょく}^{せい}

がくめい
学名 : *Euonymus Fortunei*



- ・葉 : 対生、^{えんけい}だ円形から^{ちょう えんけい}長だ円形、^{どんきよし}ふちは鈍鋸歯、^{さき えい}先は鋭~鈍頭、^{きぶ えい}基部は鋭~やや円形
^{かくしつ}革質、^{ようへい}葉柄あり、^{はがた へんい おお}葉形の変異が多い
- ・花 : ^{はな しゅうさんかじよ}集散花序につき^{たんりょくおうしよく}淡緑黄色
- ・果実 : ^{かじつ きゅうけい}球形、^{れつ なか}4裂し、^{とうせきしよく}中から^{かしゆひ つつ}橙赤色の^{しゆし}仮種皮に包まれた種子があらわれる
- ・^{きこん}気根で^{じゆもく}樹木に^{のぼ}登る

フジ (ノダフジ)

マメ科 ^かフジ属 ^{ぞく}(落葉つる性) ^{らくりょう}^{せい}

がくめい
学名 : *Wisteria floribunda* ^{えいめい}英名 : Japanese Wistaria



- ・葉 : ^{らんじょうひしんけい}卵状披針形、^{きすうりょうふくりょう}奇数羽状複葉、^{しょうりょう}小葉は^{まい}11~19枚、^{ぜんえん}全縁、^{ごせい}互生
- ・^{くき}茎は^{みぎま}右巻き
- ・花 : ^{はな}長さ^{なが}20~30cmの花序に^{かじよ}紫~^{むらさき}淡紫色の^{たんししよく}蝶形花^{ちょうけいか}を^{たすうつ}多数付ける

ツタウルシ

ウルシ科 ウルシ属 (落葉つる性)

学名 : *Rhus ambigua* 英名 : (Sumac)



- ・葉：3出羽状複葉、頂小葉はだ円形から長だ円形で短葉柄、側小葉は卵形でほとんど無柄
基部は円形か広いくさび形、先は尖る、ふちはまれに鈍鋸齒、成木では全縁
褐色の短毛あり、互生、芽吹きは赤褐色、紅葉も赤く美しい
- ・枝：若枝には褐色の短毛あり、のちに灰色となり、多くの皮目ができる
- ・花：雌雄異株、円錐花序に黄緑色から淡緑褐色
- ・気根で林床や樹木の上をばう
- ・体質によっては、かぶれるから要注意

その他

◎他の木に寄生する植物

ヤドリギ

ヤドリギ科 ヤドリギ属 (常緑小低木)

学名 : *Viscum album* 英名 : (Mistletoe)



- ・葉：倒披針形で厚い革質、先はまるく基部はくさび形、葉柄はない、対生
- ・枝：先が2~3個に分枝し緑色で毛はない、柔らかく折れやすい
- ・花：雌雄異株、花の色は黄色で基部に杯状の小苞がある
- ・果実：球形で熟すと淡黄色、果肉は粘る
- ・ブナやミズナラなどの広葉樹の枝に寄生する、冬に宿主の葉が落ちると目立つ