

オスバン S の使用上の注意点

成分：ベンザルコニウム塩化物（塩化ベンザルコニウム） 10w/v %水溶液

効能および用法・用量：手指の殺菌消毒

本剤を水で100～200倍にうすめた液（ベンザルコニウム塩化物 0.05～0.1%溶液）で洗う。

創傷面の殺菌消毒

本剤を水で400～1,000倍にうすめた液（ベンザルコニウム塩化物 0.01～0.025%溶液）で患部を洗うか、脱脂綿またはガーゼなどに浸して患部に軽く塗る。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法を守ること。
- (2) 原液のまま使用しないこと。
- (3) 原液または濃厚液が皮ふに付着した場合は、炎症を起こすことがあるので、すぐ水で洗い流すこと。
- (4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。
- (6) 患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿などに浸して貼付しないこと。
- (7) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用すること。
- (8) 外用にのみ使用し、内服しないこと。

〈その他の公衆衛生・家庭衛生分野での使用法〉

食器・器具類の消毒

茶碗、皿、コップ、ナイフ、包丁類、調理器具などは水洗いした後、本剤の200～500倍液に5分間以上浸した後水洗いする。

家屋、乗物などの消毒

床、畳、家具、調度品、手洗場、浴槽、便所、座席、手すり、電話機などは、本剤の200～500倍液で清拭するか、または噴霧する。

ごみ箱、冷蔵庫の消毒

本剤の100～200倍液を噴霧する。

その他

食品工場、清涼飲料水工場、缶詰・製菓工場の施設、器具の消毒には本剤の200～500倍液を用いる。

使用上の注意

■ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の部位には使用しないこと

顔面、粘膜（口腔、鼻腔、膣など）や陰股部（陰のうなど）





■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 患部が広範囲の人。
- (4) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮ふ	発疹、発赤、かゆみ

使用目的	効能	手指の殺菌消毒	——	創傷面の殺菌消毒
その他の使用法 (公衆衛生・家庭 衛生分野)	ごみ箱、冷蔵庫の消毒	食器・器具類の消毒 家具、乗物などの消毒 食品工場施設などの消毒	——	——
オスバンSの 希釈濃度	100倍～200倍	200倍～500倍	400倍～1000倍	——
希釈液1Lをつくる場合 洗面器約1杯	キャップ2杯～1杯  (約10mL) (約5mL)	キャップ1杯～2/5杯  (約5mL) (約2mL)	キャップ1/2杯～1/5杯  (約2.5mL) (約1mL)	——
希釈液2Lをつくる場合 洗面器約1杯	キャップ4杯～2杯  (約20mL) (約10mL)	キャップ2杯～4/5杯  (約10mL) (約4mL)	キャップ1杯～2/5杯  (約5mL) (約2mL)	——
		