

平成 30 年度
白神山地周辺地域（青森県側）における
中・大型哺乳類調査業務 報告書

平成 31（2019）年 3 月

林野庁 東北森林管理局 津軽白神森林生態系保全センター

平成 30 年度 白神山地周辺地域（青森県側）における 中・大型哺乳類調査業務 報告書

林野庁 東北森林管理局 津軽白神森林生態系保全センター

摘要：平成 30 年 4 月から 11 月にかけて、白神山地周辺地域の青森県側において赤外線センサーカメラを用いた中・大型哺乳類の調査を実施した。32 調査地点から合計 20 種 1,816 個体、そのうち哺乳類は 14 種 1,721 個体撮影された。最も個体数が多かった種はタヌキの 314 頭で、次いでアナグマ 298 頭、カモシカ 232 頭、ニホンザル 182 頭と続いた。また近年分布拡大が懸念される種として、ニホンジカが 12 頭、ハクビシンが 159 頭撮影された。

キーワード：赤外線センサーカメラ、中・大型哺乳類、白神山地、ニホンジカ

Investigation of medium- and large-sized mammals around the Shirakami Mountain Range in Aomori Prefecture, Japan, in 2018

TSUGARU-SHIRAKAMI Forest Ecosystem Conservation Center,
TOHOKU Regional Forest Office, Forestry Agency,
Komemachi 25-2, Ajigasawa, Nishitsugaru, Aomori 038-2754, Japan

ABSTRACT: An investigation of medium- and large-sized mammals using infrared-triggered camera was conducted around the Shirakami Mountain Range in Aomori Prefecture, Japan, from April to November 2018. A total of 1,816 individuals comprising 20 species were photographed in 32 investigation spots. A total of 1,721 individual mammals were observed, comprising 14 species. The most identified species was the raccoon dogs (*Nyctereutes procyonoides*), for which 314 individuals were observed, followed by 298 Eurasian badger (*Meles meles*), 232 Japanese serow (*Capricornis crispus*), and 182 Japanese macaque (*Macaca fuscata*). In addition, 12 sika deer (*Cervus nippon*) and 159 masked palm civets (*Paguma larvata*) were photographed. The expansion of the distribution of these species has been a concern in recent years.

Key words: infrared-triggered camera, medium- and large-sized mammals, Shirakami Mountain Range, sika deer

1. はじめに

白神山地世界遺産地域管理計画（環境省ほか 2013）では、遺産地域を科学的知見に基づき順応的に管理していくため、白神山地世界遺産地域モニタリング計画（白神山地世界遺産地域連絡会議 2017）に基づき、ブナ林生態系の長期的なモニタリングを実施することとしている。平成 29 年に改訂された当モニタリング計画では、中・大型哺乳類相の現況把握や確認位置の記録が重点調査に位置づけられているほか、ニホンジカ（以下シカ）の生息域についても具体的な調査項目として挙げられている。

シカは一部の忌避植物を除くほぼ全ての植物を採食することが知られており（高槻 1989・2006）、近年全国的に分布域の拡大傾向が続き、密度の著しく高い地域の森林では下層植生が消失するなど、生態系に大きな影響を与えている（林野庁 2018；環境省 2018）。白神山地周辺地域においては、平成 22 年以降毎年シカが確認されるようになった（秋田魁新報 2013）。そのため上記モニタリング計画に基づき、平成 25 年度に環境省 東北地方環境事務所（2014）によりシカを含む中・大型哺乳類の実地調査手法が検討され、翌 26 年度から東北地方環境事務所と東北森林管理局による赤外線センサーカメラ（以下センサーカメラ）を用いた哺乳類のモニタリング調査が開始された。

本調査は、青森・秋田両県の主に世界遺産地域内を東北地方環境事務所 西目屋自然保護官事務所が実施し、遺産地域周辺の青森県側を津軽白神森林生態系保全センターが、秋田県側を藤里森林生態系保全センターが担当している。本報告は、当センターが実施した平成 30 年度分の調査結果を取りまとめたものである。

2. 調査地及び調査方法

（1）調査地

平成 30 年 4 月 12 日から 11 月 30 日にかけて、青森県西津軽郡深浦町に 17 箇所、同郡鱒ヶ沢町に 5 箇所、弘前市に 1 箇所、中津軽郡西目屋村に 9 箇所の各箇所に 1 台ずつ、合計 32 台のセンサーカメラを設置した。全箇所が東北森林管理局 津軽森林管理署管内の国有林内である。各設置箇所の緯度・経度、概況等を表 1 に、位置図を図 1・2 に、設置状況や設置箇所等の景観については写真票 1～32 に示す。

（2）使用機器

センサーカメラは、以下の 2 機種を使用した。

- ・ TREL10J（㈱GI Supply）
- ・ TREL10J-D（TREL10J の後継機種 ㈱GI Supply）

調査地点番号 2，16～20，26～29，31，32 の合計 12 箇所に TREL10J-D を配置し、残り 20 箇所で TREL10J を使用した。

TREL10J 及び 10J-D の撮影時における設定は、設置当初は以下のとおり東北地方環境事務所（2014）に従った。

- ・モード：静止画 ・静止画解像度：5M ・連続撮影：3枚
- ・センサー感度：高 ・インターバル：30分

(3) 設置方法

設置箇所は、哺乳類が歩行し易い作業道や歩道沿い、または足跡や糞など生息痕が多く見られる場所を選定した（東北地方環境事務所 2014）。カメラの設置には立木を利用し、地面から 1.5m 前後の高さにやや下向きに角度を付けて、カメラに付属する専用のベルトで固定した。哺乳類を誘引するための餌は、全箇所で使用していない。

カメラを設置する際、カメラ本体を覆う金属製の保護カバー内部にクモ類が営巣するのを防ぐため、カバー内にパラジクロルベンゼン製剤の「ネオパラエース」（エステー株式会社）を 1 台につき 1 包ずつ挿入した。設置期間中はおおむね 1 ヶ月に 1 回の頻度で巡回し、データ記録媒体の SD カードと電池の交換を行った。

(4) 解析方法

撮影された画像から種の同定を行い、調査地点ごとに確認種と個体数を記録した。連続撮影されているものについては、一連の撮影で写った最大個体数をカウントした（東北地方環境事務所 2014）。

集計した各種の延べ撮影個体数について、調査地点別・月別・時間別に取りまとめ比較した。その際、調査地点や月ごとにカメラの稼働日数が異なるため、10 カメラナイト（以下 CN：カメラ 1 台を 1 晩かけた場合を 1CN と定義したもの）当たりの延べ撮影個体数を以下の式で算出し（東北地方環境事務所 2014）、日数の差異を補正した値を使用した。

$$10\text{CN 当たりの延べ撮影個体数（以下補正個体数）} = \text{延べ撮影個体数} / \text{CN} \times 10$$

3. 結果及び考察

(1) 撮影状況

本調査における動物の撮影個体数は、全 32 調査地点を通じて不明種を含めて合計 1,816 個体、そのうち哺乳類は 1,721 個体であった（表 2）。正確な種まで同定できた確認種数は哺乳類 14 種、鳥類 6 種であった。撮影された動物全種の写真については、写真票 33～44 に示す。

最も撮影個体数が多かった種はタヌキの 314 頭で、次いでアナグマ 298 頭、カモシカ 232 頭、ニホンザル（以下サル）182 頭、ハクビシン 159 頭と続き、これら上位優占 5 種で全哺乳類撮影個体数の約 69% が占められる結果となった。

哺乳類の補正個体数が特に多かった調査地点としては、25 の 9.66 個体、29 の 8.32 個体、2 の 7.48 個体等が挙げられる。哺乳類の種数については調査地点 24・30 が 11 種と最大で、次いで 29・31 が 10 種、8・22・25 が 9 種ずつ撮影された。

(2) 調査地点別・月別・時間別個体数

撮影された哺乳類について、調査地点別に補正個体数を集計したものが図3である。哺乳類全種を含めた総補正個体数が最も多かった調査地点25は、タヌキの補正個体数が全調査地点中最大の値を示した。次いで総補正個体数の多かった調査地点29は、テンやハクビシンが全調査地点中最大の値となり、特にハクビシンにおいては突出して高い値を示した。3番目に補正個体数が高かった調査地点2は、キツネ・タヌキ・アナグマが多く撮影されており、キツネの補正個体数が全調査地点中最大で、次点となる調査地点29の補正個体数より2倍以上高かった。

図4に、全調査地点で撮影された哺乳類の補正個体数を、撮影月ごとに集計したものを示す。なお32台全てのセンサーカメラを設置し終えたのが5月下旬で、撤去作業を11月中旬から始めたため(表1)、4・5・11月については6月から10月の補正個体数と比較して過小な値となっている。全種含めた月別補正個体数は、7月に一旦減少したものの春期から夏期にかけて増加し、8月をピークに秋期から冬期にかけて減少へ転じる傾向が見られた。上位優占5種について見ると、サル・アナグマ・ハクビシン・カモシカについては、全種含めた季節変動に概ね同調する傾向を示したが、タヌキは8月以降の変動がほぼ見られなかった。キツネとテンの補正個体数は5月から11月にかけて増加した。

全調査地点で撮影された哺乳類の個体数を、撮影時間ごとに集計したものが図5である。イヌとニホンリスは昼間のみ撮影され、ツキノワグマとカモシカは昼夜問わず出現した。その他の哺乳類については、おおむね夜間に活動する傾向が認められた。

(3) シカ及び外来哺乳類の確認状況

本調査期間中、調査地点7で3頭、6・32で各2頭、3・10・13・19・30で各1頭の合計12頭のシカが撮影された(表2, 写真票41~44)。撮影されたシカは全てオスであり、時期は全て9~11月の秋期に確認された。角が1尖の若齢のオスが複数箇所撮影された一方でメスは確認されず、また撮影が秋期に集中している傾向から、シカは白神山地周辺に定着はしておらず分散移動中の個体が撮影されたものと推測される(三浦1998; 山崎・古林1995)。

また、全32箇所の調査地点のうち17箇所から、ハクビシンが合計159頭確認された。(表2, 写真票35)。雑食性の本種は果実や野菜類等を摂食するため、各地の果樹園や農園で被害が発生しており(農林水産省生産局2008)、生態系被害防止外来種リスト(環境省・農林水産省2016)において重点対策外来種に指定されている。ハクビシンの生息密度が今後さらに高まれば、白神山地の森林生態系が攪乱される懸念があるため、引き続き今後の動向に注視する必要がある。

謝辞

東北地方環境事務所 西目屋自然保護官事務所の皆様には、当センターで本調査を開始した平成 26 年度当初から、シカの生態や生息に関する有益な情報をいただいている。ここに記して深く感謝の意を表する。

引用文献

- 秋田魁新報 (2013) 白神周辺, シカ目撃増 (2013 年 10 月 8 日朝刊). 秋田魁新報社, 秋田.
- 環境省 (2018) 平成 30 年度版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書. 「第 2 章 生物多様性の保全及び持続可能な利用～豊かな自然共生社会の実現に向けて」, pp.129-132, 環境省,
<http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h30/pdf/full.pdf> (2019 年 2 月 7 日閲覧).
- 環境省・農林水産省 (2016) 生態系被害防止外来種リスト. 環境省 自然環境局,
<http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist.html> (2019 年 2 月 7 日閲覧).
- 環境省・林野庁・文化庁・青森県・秋田県 (2013) 白神山地世界遺産地域管理計画. 環境省 東北地方環境事務所 白神山地世界遺産センター,
<http://tohoku.env.go.jp/nature/shirakami/report/pdf/20150401a.pdf> (2019 年 2 月 7 日閲覧).
- 環境省 東北地方環境事務所 (2014) 平成 25 年度 白神山地における中・大型哺乳類調査等業務報告書. 東北地方環境事務所, 宮城.
- 三浦慎悟 (1998) 哺乳類の社会. 「哺乳類の生物学 4 巻 社会」高槻成紀・粕谷俊雄 (編), pp.10-65, 東京大学出版会, 東京.
- 農林水産省 生産局 (2008) 野生鳥獣被害防止マニュアルーハクビシナー. 農林水産省, 東京.
- 林野庁 (2018) 平成 29 年度森林及び林業の動向 (平成 30 年 6 月 1 日公表). 「第 II 章 森林の整備・保全」. pp.37-82, 林野庁,
<http://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/29hakusyo/attach/pdf/zenbun-40.pdf> (2019 年 2 月 7 日閲覧).
- 白神山地世界遺産地域連絡会議 (2017) 白神山地世界遺産地域モニタリング計画 平成 29 年 3 月改訂. 環境省 東北地方環境事務所 白神山地世界遺産センター,
http://tohoku.env.go.jp/nature/shirakami/monitoring/result/monitoring_plan2017.pdf (2019 年 2 月 7 日閲覧).
- 高槻成紀 (1989) 植物および群落に及ぼすシカの影響. 日本生態学会誌 39 : 67-80.
- 高槻成紀 (2006) シカの生態誌. 東京大学出版会, 東京.
- 山崎晃司・古林賢恒 (1995) 西丹沢における若齢オスニホンジカの分散の一例. 日本林学会誌 77 (4) : 305-313.

平成 30 年度
白神山地周辺地域（青森県側）における
中・大型哺乳類調査業務 報告書

平成 31（2019）年 3 月



林野庁 東北森林管理局 津軽白神森林生態系保全センター
〒038-2754 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字米町 25-2
TEL : 0173-72-2931 FAX : 0173-72-2932

所長 上杉 修一 自然再生指導官 吉川 浩人
生態系管理指導官 三浦 幸久

調査全般 : 専門官 葛西 伸彦・行政専門員 川村 幸春
報告書作成 : 葛西 伸彦
写真票作成 : 下山 優美